

Protokoly RA

Anti TNF s.c.

Pri zahájení a následne á 3 mesiace: protokol , FW, CRP, KO+dif., kreatinin, glykémia, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., HAQ,

Raz ročne: protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, glykémia, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., ANA, antiDNP, CB, albumíny, cholesterol, HDL cholesterol, TG, pľúcne vyšetrenie, Quantiferon , HAQ, rtg snímky ruky AP, rtg nohy AP – podľa rozhodnutia lekára,

AntiTNF i.v.

Pri podaní: protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, glykémia, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., HAQ

Raz ročne: protokol, FW, CRP, Ko+dif., kreatinin, glykémie, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., cholesterol, HDL cholesterol, TG, ANA, antiDNP, CB, albumíny, Quantiferon, pľúcne vyšetrenie, HAQ, rtg ruky AP, rtg nohy AP – podľa rozhodnutia lekára,

Tocilizumab i.v.

Pri zahájení a následne á 3 mesiace : protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, glykémia, moč + sed., (každých 6 mesiacov cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy), HAQ

Raz ročne: protokol , FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., glykémia, cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, ANA, antiDNP, celkové bielkoviny, albumíny , Quantiferon, , pľúcne vyšetrenie, HAQ, rtg ruky AP, rtg nohy AP – podľa rozhodnutia lekára,

Abatacept i.v.

Zahájenie a následne á 3 mesiace : protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, glykémia, moč + sed., HAQ

Raz ročne: FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., glykémia, ANA, antiDNP, celkové bielkoviny, albumíny, cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy , Quantiferon, pľúcne, HAQ, rtg ruky AP, rtg nohy AP – podľa rozhodnutia lekára,

Rituximab i.v.

1.dávka (deň 1): protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, glykémia, moč+sed., HAQ

2. dávka (15.deň): protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, glykémia, moč+sed.,

Kontrola o 2 mesiace – u rajónneho reumatológa: protokol, FW, CRP, KO+dif, kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, glykémia, moč+sed., HAQ

Kontrola o 4 a viac mesiacov: protokol , FW CRP, KO+dif, kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, glykémia, moč+sed., , ANA, antiDNP, CB, albumíny, IgG, IgM, IgA, HAQ

Protokoly psoriatická artritída

Anti TNF s.c.

Zahájenie : protokol , FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, cholesterol, HDL cholesterol, TG, moč+sed., HAQ

Každé 3 a následne á 6 mesiacov počas liečby: protokol, FW, CRP, KO+dif.,kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., HAQ

Raz ročne: protokol, FW, CRP, Ko+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, cholesterol, HDL cholestrel, TG, moč + sed., ANA, antiDNP, CB, albumíny, pľúcne vyšetrenie, Quantiferon, HAQ, rtg ruky AP, rtg nohy AP – podľa rozhodnutia lekára,

AntiTNF i.v.

Pri podaní: protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, ,AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., HAQ

Raz ročne : protokol , FW, CRP, Ko+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, cholesterol, HDL cholestrol, TG, moč + sed., ANA, antiDNP, CB, albumíny, pľúcne vyšetrenie, Qunatiferon, HAQ, rtg ruky AP, rtg nohy AP – podľa rozhodnutia lekára,

Protoly Ankylozujúca spondylitída

AntiTNF s.c.

Zahájenie: protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., glykémia

Každé 3 mesiace počas liečby – protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed.

Po roku liečby a následne raz ročne : protokol, FW, CRP, Ko+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed., ANA, antiDNP, CB, albumíny, Quantiferon, pľúcne vyšetrenie, glykémia

BASFI- na začiatku a 1x ročne

Rtg. snímky každé 2 roky

AntiTNF i.v.

Pri podaní – protokol, FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč + sed.

Po roku liečby a následne raz ročne : protokol, FW, CRP, Ko+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, moč +sed., ANA, antiDNP, CB, albumíny, pľúcne vyšetrenie, glykémia, Quantiferon, pľúcne,

BASFI- na začiatku a 1x ročne

Rtg. snímky každé 2 roky