Protokol pri aplikácii biologickej liečby . RA – Mabthera – prvá dávka (alebo ďalšia dávka - len v prípade intolerancie).

1.dávka (1. deň) 2. dávka (15.deň) cyklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dňa
Meno pacienta: Rodné číslo RNP

	vpravo		**Vľavo**	
	bolesť	**opuch**	**Bolesť**	**opuch**
Rameno				
Lakeť				
Zápästie				
MCP I				
MCP II				
MCP III				
MCP IV				
MCP V				
PIP I				
PIP II				
PIP III				
PIP IV				
PIP V				
Koleno				
Celkovo				

VAS bolesti pacienta
---------- mm
VAS: Celkové hodnotenie aktivity ochorenia pacientom
---------- mm
VAS : Celkové hodnotenie aktivity lekárom
---------- mm

Počet citlivých kĺbov ..... Únava za posledný týždeň
Počet opuchnutých kĺbov 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FW .....
VAS pacienta v mm ..... Ranná stuhlosť: hod.
DAS 28 .....
pracuje nepracuje (PN, ID pre RA, ID pre iné ochorenie, starobný D, nezamestnaný)

Hmotnosť ……. kg dávka.....
Aplikácia infúznou pumpou: Ukončenie 4 hod. 15 min.

Min.	mg/hod.	ml/hod.	TK	Pulz
0 – 30	50mg/hod	12,5		
31 – 60	100mg/hod	25		
61 – 90	150mg/hod	37,5		
91 – 120	200mg/hod	50		
121 – 150	250mg/hod	62,5		
151 – 180	300mg/hod	75		
181 – 210	350mg/hod	87,5		
211 – 255	400mg/hod	100		

HAQ priložený. Hodnotenie:
Odber pri aplikácii : FW, CRP, KO+dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, ALP, glykémia, moč + sed., ANA, antiDNP, IgG, IgA, IgM
Pečiatka a podpis lekára